



¿SE DEBERÍA EVALUAR LA DISFUNCIÓN TIROIDEA MÁS FRECUENTEMENTE EN BEBÉS CON SÍNDROME DE DOWN?

La División de Endocrinología Pediátrica de UMass Memorial Children's Medical Center está haciendo un estudio de investigación para determinar si a los bebés con síndrome de Down se les debería evaluar si tienen trastornos tiroideos a intervalos más frecuentes durante el primer año de vida.

Durante los primeros tres años de vida, la hormona tiroidea es *crítica* para el desarrollo del cerebro. El diagnóstico y tratamiento temprano de los problemas tiroideos puede mejorar el desarrollo neurológico en *todos* los bebés.

Este estudio consiste en detectar los problemas tiroideos tomando una muestra de sangre mediante una punción en un talón o un dedo de una mano o un pie a las 2 y 4 semanas de edad, y luego cada mes hasta los 12 meses. Para que sea más conveniente, estas muestras de sangre pueden obtenerse en el consultorio de su pediatra. Si a su bebé se le diagnostica un trastorno tiroideo, el tratamiento comenzará inmediatamente.

Crterios

- Recién nacido con síndrome de Down (con 30 o más semanas de gestación)
- Inscripción antes de los 6 meses de edad

Si le interesa obtener más información acerca de este estudio, llame a la Dra. Penny Feldman al 508-334-7575, o escríbale a penny.feldman@umassmemorial.org.

Se ofrecerá compensación por cada cita.